GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

HO-LEN-COMPLEX Poly-cyl-Tropfen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Poly-cyl-Tropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.
Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Poly-cyl-Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Poly-cyl-Tropfen beachten?
3. Wie sind Poly-cyl-Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Poly-cyl-Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Poly-cyl-Tropfen und wofür werden sie angewendet?

Poly-cyl-Tropfen sind ein homöopathisches Arzneimittel.
Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: rheumatische Erkrankungen der Muskeln, Wirbelsäule und Gelenke, deren Ursachen und Folgeerscheinungen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.
Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Poly-cyl-Tropfen sind ein homöopathisches Komplexmittel, das sich aus folgenden Einzelmitteln zusammensetzt: Acidum sulfuricum, Cinchona pubescens, Colchicum autumnale, Solanum dulcamara, Echinacea, Ferrum phosphoricum, Guajacum, Kalium jodatum, Toxicodendron quercifolium, Filipendula ulmaria.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Poly-cyl-Tropfen beachten?

Poly-cyl-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe, insbesondere gegen Chinin, Salicylat oder Giftsumachgewächse, oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- wenn Sie schwanger sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Poly-cyl-Tropfen ist erforderlich,
wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt und die Beschwerden weiter fortbestehen, dann ist eine ärzliche Beratung erforderlich.

Dieses Arzneimittel enthält pro Einzeldosis (7 – 15 Tropfen) 102 - 219 mg Alkohol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden.
Der Alkoholgehalt ist bei Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose in geringsten Mengen. Bitte nehmen Sie Poly-cyl-Tropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Kinder:
Die Anwendung von Poly-cyl-Tropfen bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Zu Beginn der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln kann es zu einer vorübergehenden Verschlimmerungen der bestehenden Beschwerden kommen (Erstverschlimmerung). In einem solchen Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Bei Einnahme von Poly-cyl-Tropfen mit anderen Arzneimitteln:
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Das Arzneimittel darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Poly-cyl-Tropfen haben keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.
Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von 46,7 Gew.-% (m/m).

3. Wie sind Poly-cyl-Tropfen einzunehmen?

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 2 - 3 mal täglich 7 - 15 Tropfen.
In akuten Fällen kann die Einnahmehäufigkeit auf 5 - 10 Tropfen jede halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, erhöht werden.

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser (1/2 Teelöffel) einnehmen und einige Zeit im Mund belassen. Die Einnahme sollte unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Sollte innerhalb einer Woche keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Anwendung von Poly-cyl-Tropfen bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Wenn Sie eine größere Menge Poly-cyl-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten:
Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Poly-cyl-Tropfen vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bisher wurden keine Nebenwirkungen bekannt.
Wie alle Arzneimittel können Poly-cyl-Tropfen Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen.
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie sind Poly-cyl-Tropfen aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.
Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Poly-cyl-Tropfen enthalten:
Die Wirkstoffe sind: 1 g (= 30 Tropfen = 1,09 ml) enthält 0,1 g Acidum sulfuricum Dil. D4, 0,1 g Cinchona pubescens Dil. D2, 0,1 g Colchicum autumnale Dil. D4, 0,1 g Solanum dulcamara Dil. D4, 0,1 g Echinacea Ø, 0,1 g Ferrum phosphoricum Dil. D8, 0,1 g Guajacum Dil. D3, 0,1 g Kalium jodatum Dil. D4, 0,1 g Toxicodendron quercifolium Dil. D4, 0,1 g Filipendula ulmaria Ø.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Ethanol, gereinigtes Wasser (Gesamtethanolgehalt 46,7 Gew.-%); Lactose in geringsten Mengen

Wie Poly-cyl-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung:

Rotbraune, nahezu klare Lösung in braunen Glasflaschen mit Schraubverschluß und Tropfeinsatz.
Packungsgröße: 30 ml

Trübungen sind ohne Einfluss auf die Wirksamkeit.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Pharma Liebermann GmbH
Hauptstr. 27
D-89423 Gundelfingen
Tel.: 0049-9073-958930
Fax.: 0049-9073-9589355
E-Mail: info@pharma-liebermann.de

Z.Nr.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im
Juni 2010